GEIPI-POLYTECH v1 ©EXATECH																			
Nom de famille : (Suivi, s'il y a lieu, du nom d'usage)																			
Prén	iom(s) :																		
	uméro ndidat :	uméro	est ce	elui aui	figure s	sur la ci	onvoca	tion ou	la feuil	lle d'ém	nargeme	é(e) l	e :		/		/		
 Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d'identification en MAJUSCULES. Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif. Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire); éviter le stylo plume à encre noire. N'effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon. 																			

Epreuve Sciences de la Vie et de la Terre Document réponses


EXERCICE I (16 points)

I-1 - Métabolisme des cellules végétales

I-1-1	A: Cytosol, Cytoplasme	B : Vacuo	le		C: Paroi cellulaire, paroi squelettique, paroi, paroi pectocellulosique, paroi végétale						
D : Membra plasmique,	ane cellulaire, membrane membrane	E : Appar REL	eil de Gol	lgi, Golgi,	F: Réticulum endoplasmique (granuleux / rugueux), RE, REG, RER						
G : Noyau	H: Péroxysome, g	Vésicule, gouttelette		chondrie	J: chloroplaste						
I-1-2- Equa	tion 1 : La photosynthèse			Equation 2 : La respiration, la respiration cellulaire							
☐ une réacti X une réacti X une réacti X une oxyda	notosynthèse est : tion catabolique ion anabolique ion métabolique ation de l'eau et une réduc lation de composés organi			I-1-4- La respiration cellulaire est: X une réaction catabolique ☐ une réaction anabolique X une réaction métabolique ☐ une oxydation de l'eau et une réduction du CO₂ X une oxydation de composés organiques et une réduction du O₂							
I-1-5- Les con photoautotron X convertir chimique □ utiliser l'. issus de la p X utiliser l'A issus de la p X réduire du □ oxyder d'	ellules des organismes rophes ont la capacité de : l'énergie lumineuse en éne ATP et les composés rédui photosynthèse pour oxyde ATP et les composés réduit photosynthèse pour réduir u CO2 en glucides u CO2 en glucides	ergie its (NH ₂) r du CO ₂ ts (NH ₂)	hétér pu X util prespi X pro avec	I-1-6- Les cellules des organismes pluricellulaires hétérotrophes ont la capacité de : □ puiser leur énergie de l'oxydation de composés minéraux X utiliser pour leur croissance des molécules organiques □ produire de l'ATP et du NADH,H+ à l'issue de la respiration avec oxydation du O₂ X produire de l'ATP et du NADH,H+ à l'issue de la respiration avec réduction du O₂ □ réduire du CO₂ en glucose							
☐ réalise un☐ réalise un☐ réalise un☐ x réalise la cellulaire☐ est capabacO₂ en abse	cellule végétale foliaire : niquement la respiration c niquement la photosynthè photosynthèse et la respir ple d'oxyder de l'eau et de l'ence de lumière le d'oxyder des composés	se ration réduire le	X util synth □ so □ so l'ATF X son et de	I-1-8- Chloroplastes et mitochondries: X utilisent des réactions d'oxydo-réduction pour synthétiser de l'ATP à partir d'ADP □ sont le siège de réactions métaboliques identiques □ sont dépourvus d'ATP synthases, enzymes produisant de l'ATP X sont issus d'endosymbioses entre des cellules eucaryotes et des bactéries □ sont des organites dépourvus d'ADN							

I-2 – Un cas de photosynthèse animale!

I-2-1- La disparition des chloroplastes peut s'expliquer par leur excrétion par les cellules de hamster, ou bien par leur catabolisme ou encore par leur dégradation.



I-2-2- Les cellules de hamster ne sont pas devenues durablement photoautotrophes puisque l'activité photosynthétique diminue et ne perdure pas.

EXERCICE II (7 points)

La graine et la croissance des végétaux supérieurs

- **II-1-** Une graine est:
- ☐ un organe végétal issu de la reproduction asexuée
- X un organe végétal issu de la fécondation entre un gamète mâle et un gamète femelle chez les plantes à fleurs
- ☐ un gamète diploïde issu de la mitose d'une cellule totipotente
- X un organe végétal ayant accumulé des réserves en vue du développement de la plantule
- un organe photosynthétique sous-terrain contenant une plante X Aucune des réponses précédentes miniature en dormance
- II-2- On conclut de l'expérience au Lugol que les graines de sorgho:
 - □ sont riches en ARNmessager
 - □ sont dépourvues de protéines
 - □ sont riches en amidon, molécule lipidique
- ☐ réalisent le métabolisme de respiration cellulaire intensivement

II-3-1- La gravité

II-3-2- Partie racinaire : tropisme positif ; Partie aérienne : tropisme négatif

II-3-3- Ces substances sont des hormones (végétales) parmi lesquelles existent les auxines ou encore les cvtokinines

EXERCICE III (17 points) La glycémie

III-1- En seulement guelques heures, on voit que la hausse ou la baisse de la glycémie est corrigée. Le retour à la valeur d'équilibre / la valeur de consigne / la valeur de référence suppose donc l'existence d'un système de régulation assurant le maintien/le retour de la glycémie à 1g/L.

III-2- L'insuline est une hormone hypoglycémiante / qui réduit la glycémie. Le glucagon est une hormone hyperglycémiante / qui augmente la glycémie.

